

SINTESI DEI MOTIVI CHE SPINGONO AD ASSOCIARE PIU' DROGHE

Kap Keys for Clinicians based on TIP 10: *Assessment and treatment of cocaine abusing methadone maintained patients*, NCADI, 08 01 2002

Eroina + Alcol	Accentuare un high o creare euforia.
Eroina seguita da alcol	Automedicazione della sindrome di astinenza da narcotici.
Eroina + Cocaina	Speedball per accentuare od alterare l'euforia e l'high da cocaina l'eroina viene seguita da cocaina. Autocura per l'astinenza da narcotici e/o attenuazione dell'iperstimolazione da cocaina.
Cocaina + Alcol	Rafforzare l'high e modulare l'iperstimolazione da cocaina.
Cocaina seguita da Alcol	Ridurre l'ansietà da cocaina e il nervosismo e modulare il crash (funzione di <i>paracadute</i>).
Cocaina seguita da Eroina	Ridurre l'iperstimolazione e modulare il crash (<i>paracadute</i>).
Metadone + Alcol	Creare un high e accelerare il metabolismo.
Metadone + Cocaina	Moderare l'ansietà ed il nervosismo che sono frequenti con l'uso della cocaina (<i>paracadute</i>).
Metadone+ Benzodiazepine	Provocare un high accentuando l'azione del metadone.