

PATOGENESI DEI DECESSI PER OVERDOSE DA EROINA

Oliver Ph., Keen J.: *Concomitant drugs of misuse and drug using behaviors associated with fatal opiate-related poisoning in Sheffield UK 1997-2000*, *Addiction*, 98: 191-97, 2003

Sono stati analizzati i referti dei dati autoptici fra le overdosi letali che hanno avuto luogo nella città inglese di Sheffield fra il 1997-2000 (94). In maggioranza trattavasi di assuntori "regolari" di eroina; nel 20% dei casi vi era stato nelle settimane precedenti un periodo di astinenza coatta in carcere o in ospedale e naturalmente quasi tutti consumavano altre droghe e bevevano in eccesso. Le BDZ erano le sostanze concomitanti maggiormente impiegate.

E' interessante notare come malgrado l'opinione diffusa circa il prevalere dell'eroina fumata rispetto a quella iniettata la quasi totalità dei decessi hanno avuto luogo fra gli iniettori.

Va segnalato che l'uso concomitante di altre sostanze non sembra aver contribuito alla depressione dei centri respiratori in quanto dal punto di vista tossicologico le quantità di BDZ e di altre droghe misurate erano di modesto rilievo. Si affaccia invece la possibilità di un accumolo di oppiacei quando il soggetto sotto metadone si inietta eroina.