

DES-AMFETAMINA NEL TRATTAMENTO DELL'ABUSO DI COCAINA

Shearer J., Wodak A., Van Beek I.: *Pilot randomized double blind placebo controlled study of dex-amphetamine for cocaine dependence*, *Addiction*, 98: 1137-41, 2003

La cocaina in Australia viene quasi sempre iniettata, con tutte le conseguenze. Vi sono stati numerosi interventi di terapie sostitutive con anfetaminici; nella ricerca in esame, condotta presso il National Drug and Alcohol Centre di Sydney, il gruppo era soprattutto formato da prostitute e da dipendenti da oppiacei sotto metadone.

In tutto sono stati reclutati 30 abusatori di cocaina: certo, un numero esiguo rispetto alla popolazione degli abusatori in generale ma i controlli sono stati rigorosi e la randomizzazione ha consentito di confermare il valore nell'anfetaminico a 60 mg/d per 14 settimane.

Rispetto al placebo ha consentito di ridurre la percentuale dei positivi per la cocaina nelle urine dal 94% del placebo al 54% del gruppo trattato. Netta, anche, è stata la riduzione del craving, nonché dell'attività criminale. Vi sono stati anche miglioramenti nell'assetto psicologico dei dipendenti da cocaina.