

## **L'ABUSO DI FARMACI DA BANCO ANTITOSSE**

Leinwand D.: *Aumento dei casi di overdose da antitosse nei Pronto Soccorsi*; Beiser D.: *Dextromethorphan is a common cough suppressant in over the counter medicines*, National Institute of Health - Drug Enforcement Administration, 2 Gennaio 2004

L'abuso di farmaci da banco antitosse (Coricidin) sta dilagando soprattutto fra gli adolescenti; la codeina, che è alla base degli abusi, necessita di una prescrizione medica, ma in almeno 120 farmaci generici è contenuto il dextrometatorfano designato con il nome di Robo (dove il nome di Robotripping e/o di Tussing). Tali farmaci assunti in forti dosi possono provocare allucinazioni simili a quelle prodotte dalla pcp.

I sintomi principali sono: sudorazione, ipertermia, bocca asciutta, cute secca con prurito, diplopia, allucinazioni, deliri, gastralgie, vomito, ipertensione, arrossamento del volto, intorpidimento delle dita e dell'alluce, forte cefalea fino alla perdita di coscienza.

I più colpiti sono gli studenti che hanno conosciuto i prodotti su internet; i consumi sono di gruppo ed i primi sintomi di overdose si manifestano dopo 2-3 ore dal consumo di 5-6 pasticche, spesso nel contesto di allucinazioni collettive.